



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE DEFECTOS AL NACIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2025.

DR EZEQUIEL DIAZ CRUZ

Oaxaca de Juárez a 31 de enero de 2026



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INTRODUCCION

Informe SVEDAN

Fuente:
**Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera**

Corte:
31 de enero de 2026


La Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades no Transmisibles en los últimos años ha recobrado el interés a nivel nacional sin embargo se requiere continuar haciendo cambios y mejoras por lo que el informe trimestral describe el panorama epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento (SVEDAN) en el Estado de Oaxaca y el comportamiento de factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de casos y defunciones que se presentan y su comportamiento epidemiológico estatal y nacional. Dicha información es de gran utilidad para los tomadores de decisiones en los diferentes niveles de atención; trátese en todos los niveles de atención, unidades médicas, hospitales, jurisdicciones e instituciones del sector público y privado en el Estado, ya que los datos proporcionados por la plataforma nos deben orientar a llevar a cabo intervenciones enfocadas principalmente en la prevención y atención de los defectos congénitos al nacimiento. Cabe mencionar que a partir del 2016 con el inicio de la vigilancia epidemiológica del defecto craneofacial (Microcefalia), y 2023 con la introducción de los defectos Osteomusculares prácticamente se retoma en el estado la vigilancia epidemiológica de estos defectos congénitos para la prevención de casos; así mismo solicitar apoyo para evitar la subnotificación y sobregistro de casos y así dar el seguimiento y tratamiento oportuno para evitar el menor porcentaje daños a la salud de este tipo de padecimientos en la población.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INCIDENCIA

INCIDENCIA Y TASA POR JURISDICCION SANITARIA
TERCER TRIMESTRE 2025



Durante el tercer trimestre 2025, el estado de Oaxaca se han registrado 54 casos de DAN con una incidencia de 73.83 por 100000 nacidos vivos

Incidenia por jurisdicción sanitaria de residencia primer trimestre 2025.



Las jurisdicciones de Sierra y Tuxtepec registran la mayor incidencia con 145.11 y 108.03 por 100000 nacidos vivos

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROPORCION DE CASOS NOTIFICADOS POR INSTITUCION TERCER TRIMESTRE 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
01 de octubre 2025



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Para el tercer trimestre 2025, El IMSS-OPD notifico 23(43%) casos, e IMSS-BIENE notifican 17 (30%) entre ambos suman 75% de casos notificados, el resto 9 (17%) casos notificado por el IMSS-RO con 4 (7%) casos notificados por el ISSSTE y por SSA 1 (2%) notificados en Oaxaca.


Antecedentes de los padres

Distribución de casos de DaN por grupo de edad y tasa tercer trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025



El grupo de edad de 20 a 24 años notifica el mayor numero de casos con 19 (34%) casos, le sigue el grupo de 25-29 y 30-34 con 11 (20%) casos, con 8 (14%) y el grupo de 35-39 años notifico 6 (11%) casos. la mayor tasa de incidencia se observó en el grupo de 20-24 con 10.7 casos por 100 mil mujeres, le sigue grupo de 25-29 y 30-34 con una tasa de 6.3 y de 15-19 años años con 4.3 casos por cada 100 mil mujeres.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

ANTECEDENTES DE LOS PADRES


Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera


Corte:
01 de octubre 2025

La ocupación materna de los casos de DAN en Oaxaca el más frecuente es el hogar con 80%, mientras que en los padres es agricultura con 48%.

OCUPACION MADRE TERCER TRIMESTRE 2025



OCUPACION PADRE TERCER TRIMESTRE 2025




DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Antecedentes de los padres

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
01 de octubre 2025



La enfermedad crónica mas frecuente es la diabetes mellitus con 4 (7.4 %), le sigue Obesidad y otras enfermedades crónicas con 3(6%) casos, de las otras enfermedades crónicas (hipertiroidismo 1 e hipotiroidismo 2), e hipertensión 1(2%) casos el resto enfermedades crónicas se encuentra en 0. Se tiene como defecto craneofacial los 7 casos; Labio y paladar hendido 5 (9%), casos y microtia 2 (3.7%) casos, en cambio en los padres de los 54 casos notificados 4 (7%) casos, la Obesidad 2 casos ((3.7%) con Diabetes Mellitus e hipertensión 1 caso (1.8%), los casos el defecto que presentan es craneofacial 4 (7.4%): 2 labio y paladar (3.7%) y microtia, holopocencefalia 1 caso (3.7%).


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Antecedentes de los padres

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
01 de octubre 2025



- Las madres de hijos con DAN recibieron en promedio 6.2 consultas prenatales.
- El 68.5 % refirió recibir 1 consulta prenatal por lo menos en el primer trimestre

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


Antecedentes de los padres

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
01 de octubre 2025

El antecedente de los padres con casos de defectos al nacimiento por estado civil 30 (56%) de casos viven en Unión Libre, 21 (38%) casos son casados y 3 (6%) son solteras.



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


Antecedentes de los padres

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
01 de octubre 2025

INGESTA DE ACIDO FOLICO TERCER TRIMESTRE 2025



El 67 % de los casos tomo ácido durante el primer trimestre, El 15% de las madres lo hizo después del primer trimestre de gestación y el 4% no tomo ácido fólico. En el caso de las madres que consumieron ácido fólico durante el primer trimestre los defectos al nacimiento mas frecuentes fue el craneofacafial con 31(86%) casos, siendo el labio y paladar hendido el que mas se presento con 13 (42%) casos. En cuanto a los defectos del tubo neural se presentaron 4 (11%) el defecto mas frecuente es Espina Bífida 3 (75%) casos.

FACTORES DE RIESGO PADRES CON DEFECTOS AL NACIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2024

Al tercer trimestre 2025, los padres (madre y padre), la madres solo presentaron 1 (1.8%) casos y el padre no presento ningún defecto al nacimiento en los 54 casos notificados.



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


FACTORES DE RIESGO DE HIJOS CON DAN CON CONSANGUINIDAD EN LOS PADRES EN EL TERCER TRIMESTRE 2025

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025

El 4% en los padres presento algún antecedente de consanguinidad.
• Con respecto al antecedente familiar de defectos, la rama paterna presento 1 /2%) familiar con algún defecto al nacimiento con datos de consanguinidad.



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FACTORES DE RIESGO DE HIJOS CON DAN CON CONSANGUINIDAD EN LOS PADRES EN EL TERCER TRIMESTRE 2025

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025

- Con respecto al antecedente familiar de defectos, la rama paterna presentó un caso con algún defecto al nacimiento con datos de consanguinidad, siendo defecto craneofacial (labio y paladar hendido).

DEFECTOS REPORTADOS EN RAMA
FAMILIARES MATERNOS

LABIO Y PALADAR
HENDIDO (1 CASO)

Factores de Riesgo


HIPERTERMIA MATERNA TERCER TRIMESTRE 2025

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Los casos de DaN en el tercer trimestre 2025, el (87%) 22 casos no tuvo hipertermia, el (7%) 4 casos presento hipertermia en el primer trimestre del embarazo y el (6%) 3 casos después del primer trimestre del embarazo algún momento de el embarazo



Factores de Riesgo

DIABETES GESTACIONAL TERCER TRIMESTRE 2025


EL 19% DE LOS CASOS PRESENTO DIABETES GESTACIONAL EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO DE LA MADRE AL TERCER TRIMESTRE 2025, LOS CASOS CON DaN SON DEFECTOS CRANEOFACIALES Y DEFECTO DEL TUBO NEURAL.

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

PROPORCION DE CASOS CON DIABETES GESTACIONAL TERCER TRIMESTRE 2025



DIAGNOSTICO DE LOS HIJOS CON MADRES CON DIABETES GESTACIONAL

DEFECTO AL NACIMIENTO	CASOS
DEFECTO CRANEOFACIAL (1)	LABIO Y PALADAR HENDIDO (5), MICROTIA (2), ATRESIA DE COANAS (1), HOLOPROCENCEFALIA (1)
DEFECTO DEL TUBO NEURAL	MIELOMENIGOCELE (1)

Factores de Riesgo

INFECCIONES TERCER TRIMESTRE 2025

CON RESPECTO A LAS INFECCIONES NO SE REPORTARON EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

INFECCION	CASOS	TRIMESTRE DE EMBARAZO
DENGUE	0	
CHIKV	0	
ZIKA	0	
MAYARO	0	
RUBEOLA	0	
HERPES VIRUS	0	
TOXOPLASMA	0	
VIH	0	
CITOMEGALOVIRUS	0	
INFECCION DE VIAS URINARIAS	3	ANTES DEL EMBARAZO (1), SEGUNDO TRIMESTRE (1), PRIMER TRIMESTRE (1)

Factores de Riesgo

INFECCIONES PRESENTADAS EN LAS MADRES EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO Y TIPO DE DEFECTO AL NACIMIENTO EN EL TERCER TRIMESTRE 2025

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
01 de octubre
de 2025

INFECCION	DEFECTO DEL TUBO NEURAL	DEFECTO CRANEOFACIAL
DENGUE	0	
CHIKV	0	
ZIKA	0	
MAYARO	0	
RUBEOLA	0	
HERPES VIRUS	0	
TOXOPLASMA	0	
VIH	0	
CITOMEGALOVIRUS	0	
INFECCION DE VIAS URINARIAS	0	3

Factores de Riesgo

ADICCIONES EN LOS PROGENITORES QUE PRESENTAN LOS CASOS DE DaN TERCER TRIMESTRE 2025

PROPORCION DE ADICCIONES EN LOS PADRES



La proporción de adicciones por parte de los padres en los casos de defectos al nacimiento por parte de la madre se presente en un 23%, por parte del padre se da en un 38.4%

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Factores de Riesgo


ADICCIONES EN LOS PROGENITORES QUE PRESENTAN LOS CASOS DE DaN EN EL TERCER TRIMESTRE 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
01 de octubre
de 2025

PROPORCION DE TIPO DE ADICCION EN LA MADRE



LAS ADICCIONES EN LAS MADRES SE PRESENTO EN 4% PARA TABACO Y ALCOHOL INHALABLES 2% INYECTABLES Y OTRAS CON 0.

PROPORCION DE TIPO DE ADICCION EN EL PADRE




24 (44.4%) DE LOS PADRES REFIRIO LA PRESENCIA DE ALGUNA ADICCION SIENDO EL TABACO Y EL ALCOHOL LOS MAS FRECUENTES,

Factores de Riesgo

EXPOSICIÓN A TERATOGENOS TERCER TRIMESTRE 2025

Proporcion de madres expuestas a plaguicidas. Toxicos o medicamentos



■ NINGUNO

■ UN AÑO PREVIO AL EMBARAZO

■ TRES MESES PREVIOS AL EMBARAZO

■ TRES MESES PREVIOS AL EMBARAZO ■ DURANTE EL EMBARAZO

**EL 93 % (N: 50)
NO REPORTAN
EXPOSICION A
PLAGUICIDAS,
TOXICO U OTROS
MEDICAMENTOS,
EN LAS MADRES Y
EL 7.4%
REPORTARON
ALGUNA
EXPOSICIÓN A
TERATOGENOS EN
ALGUN
MOMENTO DEL
EMBARAZO**

**Informe
SVEDAN**


**Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera**

**Corte:
01 de octubre
de 2025**

Factores de Riesgo

EXPOSICIÓN A TERATOGENOS TERCER TRIMESTRE 2025

Proporcion de Padres expuestas a plaguicidas. Toxicos o medicamentos



EL 85.2% (N:46) DEL PADRE NO REPORTA EXPOSICION A PLAGUCIDAS, TOXICOS U OTROS MEDICAMENTOS, Y 3 (5.6%) CASOS, UN AÑO PREVIO AL EMBARAZO Y 2 (3.7%) DURANTE EL EMBARAZO.

Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Atención perinatal

Distribución de casos por momento de realización del USG tercer trimestre 2025



El (39%) 21 casos se le realizó el USG no realizó USG el (61%) 33 casos.

**Informe
SVEDAN**


**Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera**

**Corte:
01 de octubre
de 2025**

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Atención perinatal

Distribución de casos por momento de realización del USG, tercer trimestre 2025



■ PRIMER TRIMESTRE ■ SEGUNDO TRIMESTRE ■ TERCER TRIMESTRE ■ ■

El 52.4% se le realizó el USG en el tercer trimestre, 7:33,3% en el segundo trimestre y 3:14.3% en el primer trimestre, no realizó USG el 61%


Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN TERCER TRIMESTRE 2025.

Distribución de casos por tipo de defecto



Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN TERCER TRIMESTRE 2025

Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DTN, los 6 defectos sujetos a vigilancia epidemiológica presentan 3 casos por espina bífida y una incidencia de 4.2, le sigue encefalocele 2 casos incidencia de 2.8 y con 1 caso anencefalia con una tasa de incidencia de 1.4 casos por cada 100 mil RNV.



Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN TERCER TRIMESTRE 2025


Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DCF, el Labio y paladar hendido reportó la mayor incidencia con 28.02 casos por cada 100 mil RNV.

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
01 de octubre
de 2025



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN TERCER TRIMESTRE 2025

Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DaN por Displasia del Desarrollo de Cadera se presenta 1 caso con una tasa de incidencia de 1.4 casos por cada 100 mil RNV.



Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ATENCIÓN PERINATAL

La vía de nacimiento más frecuente fue vía cesárea con el 65% (n:35), vía vaginal 35% (n:19) tercer trimestre 2025.



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025


CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS ATENCIÓN PERINATAL

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Distribución de casos de DTN por vía de nacimiento Oaxaca tercer trimestre 2025



Los defectos de tubo neural que se notificaron en el tercer trimestre son 6 casos la vía de nacimiento fue 3(50%) vía vaginal y 3(50%) cesárea.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS


ATENCIÓN PERINATAL

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Distribución de casos por defecto al nacimiento por vía de nacimiento Oaxaca tercer trimestre 2025



Los defectos craneofaciales que se notificaron en el tercer trimestre fueron 46 casos, el defecto por vía de nacimiento mas frecuente es cesárea 30 (65%) y vía vaginal 16 (35%) siendo el labio paladar hendido el mas frecuente.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ATENCIÓN PERINATAL

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Distribución de casos de Displasia del Desarrollo de Cadera por vía de nacimiento Oaxaca tercer trimestre 2025

DCC	cesarea	vaginal
DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERA	1	0


Los defectos de Displasia del Desarrollo de Cadera 1 caso, la vía de nacimiento fue 1(100%) cesárea.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE DaN

El 93% de los casos fueron se reportan vivos (n=50) y el 7%, casos son defunciones (n=4)).

Proporción de casos de DAN respecto al estado actual tercer trimestre Oaxaca
2025



Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE DaN TERCER TRIMESTRE 2025

Por diagnóstico las defunciones que se presentan 2 (50%) por defectos craneofaciales, y 2 (50%) defectos del tubo neural, por Anencefalia 1 (25%) defunciones y Encefalocele 1 (25%) y por labio y paladar hendido 2 (50%) los craneofaciales.




Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Por institución las defunciones, por defectos al nacimiento al tercer trimestre se presentan: IMSS-OPD 3 (75%), IMSS-RO 1 (25%), IMSS-BIEN 0 (0%), ISSSTE 0 (0%).



■ IMSS-OPD ■ IMSS-BIEN ■ ISSSTE ■ IMSS-RO


**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DTN y sexo de los casos tercer trimestre 2025

Con respecto al sexo, los defectos del tubo neural notificados durante el tercer trimestre 2025 están a la par 2 (50%) casos en el sexo masculino y 2 (50%) casos en sexo femenino



**Informe
SVEDAN**


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

**Distribución de casos de DAN por peso y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca
tercer trimestre 2025***



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

Peso en gramos al nacimiento con la mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo tercer trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

peso grs		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	Masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	2000	2650
termino (37-41 sdg)	2775	3220

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

Distribución de casos de DAN por talla y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca
tercer trimestre 2025*



Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Talla al nacimiento con la mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo tercer trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Talla		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	44	43
termino (37-41 sdg)	48	50

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025

Distribución de casos de DAN por perímetro cefálico y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca tercer trimestre 2025*



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Perímetro cefálico al nacimiento con mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo tercer trimestre 2025

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
01 de octubre
de 2025

Perímetro cefálico (cms)		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	32	32
termino (37-41 sdg)	34	34

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS TAMIZ NEONATAL

En los casos ingresados al sistema se reportó la realización de tamiz metabólico en 6 casos y auditivo en 4 casos, el resto no se realizó en el tiempo que estuvieron ingresados en un hospital.

Distribución de casos de DAN por realización de prueba de Tamiz neonatal, Oaxaca tercer trimestre 2025*



RESULTADO	TAMIZ METABOLICO	TAMIZ AUDITIVO
NORMAL (NEGATIVO)	4	3
ALTERACION	0	1
PENDIENTE	1	0
SIN RESULTADO	5	5
SOSPECHOSO	0	0
EN BLANCO	0	0
TOTAL	10	9

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Consideraciones

Incidencia

En lo que respecta a la notificación de casos de DAN durante el segundo trimestre 2025 en comparación con el año 2024, se observó una disminución porcentual del 21.3 % en la notificación de casos a la plataforma DaN, así mismo se continua considerando la disminución en la notificación de casos en pandemia de los años 2023, 2022 y 2021, respectivamente.

Con la implementación de la plataforma del sistema de DAN, se ha fortalecido la notificación en las unidades del sector, sin embargo, hay que continuar haciendo hincapié en las reuniones del COJUVE, CEVE y CONAVE con todas las instituciones; para dar cumplimiento a los indicadores de evaluación como son **notificación oportuna sobre todo en casos no registrados en plataforma DaN con los casos de RN en plataforma DGIS la cual continua siendo un problema en la notificación**, calidad que permita contar con una información que aporte confiabilidad para la toma de decisiones, así como la búsqueda de casos de microcefalia relacionados o no con ZIKA y otros padecimientos .

- Por JURISDICCION de residencia de la madre, no se han registrado casos en otros estados para el tercer trimestre.
- Para este tercer trimestre 2025 el defecto al nacimiento que se registro en la plataforma con mayor incidencia fue los defectos craneofaciales, Labio y Paladar Hendido 20 (37%) de casos con una incidencia de 28.02 casos por cada 100 mil RNV, le sigue la Microtia con 13 casos con una incidencia de 18.21 casos por cada 100 mil RNV encontrandose las pimeros DaN malformaciones craneofaciales.
- En lo que respecta a los defectos del tubo neural solo se notificaron 6 casos siendo la espina bífida respectivamente con una incidencia de 4.2 casos por cada 100 mil RNV

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre
de 2025

Consideraciones

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de de 2025

El Labio y Paladar Hendido para el primer trimestre 2025 es el defecto craneofacial notificado mas frecuentemente; entre los factores de riesgo que pudieron haber influido en su desarrollo, se tiene que:

- **14 madres (56%) tenían ≤ 20 años o ≥ 35 años**
- **9 madres (32%) refirieron haber tomado Acido Fólico durante el primer trimestre del embarazo.**
- **0 madres (0%) refirieron tener alguna enfermedad crónica**
- **1 caso (4%) reportaron antecedente de padre o madre con defectors congénitos.**
- **También de tomar en cuenta la mortalidad (n:4) que presentan los casos de defectos al nacimiento en el estado de Oaxaca, con una letalidad de letalidad 6,65 defunciones x 100.**

Consideraciones

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
01 de octubre de
2025

Dentro de los subsistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles se debe solicitar el apoyo en las reuniones CONAVE para fortalecer el CUMPLIMIENTO de los lineamientos de Manual para la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento y así poder cumplir con los indicadores de programa por todas las instituciones del sector salud.

Así mismo considero que existe una subnotificación y subregistro de casos por todas las unidades medicas del sector salud publicas y privadas.

Además se debe llevar a cabo un seguimiento de los casos para su atención, revisión y nivel de vida con el resto de la población

DIRECTORIO

MC. Efrén Emmanuel Jarquín González.

Secretario General y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Dr. Eder Lopez Toro.

Director de Prevención y Control de Enfermedades

Maos Dra. Gabriela Irene Lázaro Mendoza .

Jefa de la Unidad de Epidemiología.

Dra. Monica Cardenas Charis.

Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica.

Dr. Ezequiel Diaz Cruz

Responsable Estatal de Defectos al Nacimiento