



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE DEFECTOS AL NACIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (CIERRE) 2025 .

DR EZEQUIEL DIAZ CRUZ

Oaxaca de Juárez a 31 de enero de 2026

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INTRODUCCION

Informe SVEDAN

Fuente:
**Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera**

Corte:
31 de enero de 2026


La Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades no Transmisibles en los últimos años ha recobrado el interés a nivel nacional sin embargo se requiere continuar haciendo cambios y mejoras por lo que el informe trimestral describe el panorama epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento (SVEDAN) en el Estado de Oaxaca y el comportamiento de factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de casos y defunciones que se presentan y su comportamiento epidemiológico estatal y nacional. Dicha información es de gran utilidad para los tomadores de decisiones en los diferentes niveles de atención; trátese en todos los niveles de atención, unidades médicas, hospitales, jurisdicciones e instituciones del sector público y privado en el Estado, ya que los datos proporcionados por la plataforma nos deben orientar a llevar a cabo intervenciones enfocadas principalmente en la prevención y atención de los defectos congénitos al nacimiento. Cabe mencionar que a partir del 2016 con el inicio de la vigilancia epidemiológica del defecto craneofacial (Microcefalia), y 2023 con la introducción de los defectos Osteomusculares prácticamente se retoma en el estado la vigilancia epidemiológica de estos defectos congénitos para la prevención de casos; así mismo solicitar apoyo para evitar la subnotificación y sobregistro de casos y así dar el seguimiento y tratamiento oportuno para evitar el menor porcentaje daños a la salud de este tipo de padecimientos en la población.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INCIDENCIA

INCIDENCIA Y TASA POR JURISDICCION SANITARIA
CUARTO TRIMESTRE 2025



Durante el cuarto trimestre 2025, el estado de Oaxaca se han registrado 84 casos de DAN con una incidencia de 121.07 por 100000 nacidos vivos

Incidenia por jurisdicción sanitaria de residencia cuarto trimestre 2025.



Las jurisdicciones de Tuxtepec y Sierra registran la mayor incidencia con 204.06 y 186.57 por 100000 nacidos vivos

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROPORCION DE CASOS NOTIFICADOS POR INSTITUCION CUARTO TRIMESTRE 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
31 de enero 2026



Para el cuarto trimestre 2025, El IMSS-OPD notifico 39 (46%) casos, IMSS-BIEN notifican 22 (26%) casos, IMSS-RO e16 (19%) casos ambos suman 72% de casos notificados, el resto 7 (9%) casos notificados por el ISSSTE y por SSA en Oaxaca.


Antecedentes de los padres

Distribución de casos de DaN por grupo de edad y tasa cuarto trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
31 de enero de 2026



El grupo de edad de 20 a 24 años notifica el mayor número de casos con 30 (36%) casos, le sigue el grupo de 25-29 con 18 (21%) casos, el grupo de 30-34 años con 14 (17%) y el grupo de 15-19 años notifico 11 (13%) casos. la mayor tasa de incidencia se observó en el grupo de 20-24 con 16.9 casos por 100 mil mujeres, le sigue grupo de 25-29 con una tasa de 10.4, de 30-34 con una tasa de 7.8 y de 35-39 años años con tasa de 7 casos por cada 100 mil mujeres.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

ANTECEDENTES DE LOS PADRES


Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera


Corte: 31 de enero de
2026

La ocupación materna de los casos de DAN en Oaxaca el más frecuente es el hogar con 77%, mientras que en los padres es agricultura con 48%.

OCUPACION MADRE CUARTO TRIMESTRE 2025



OCUPACION PADRE CUARTO TRIMESTRE 2025



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


Antecedentes de los padres

Informe SVEDAN


Fuente:
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Craneofaciales y Luxación Congénita de Cadera

Corte:
31 de enero de 2026

DISTRIBUCION MATERNA POR TIPO DE ENFERMEDAD CRONICA
CIERRE 2025



DISTRIBUCION PATERNA POR TIPO DE ENFERMEDAD CRONICA
CUARTO TRIMESTRE 2025



La enfermedad crónica más frecuente son otras enfermedades crónicas con 6 (7%) casos, le sigue la diabetes mellitus con 5 (6%), le sigue obesidad 3 (4%) de caso, hipertensión 2 (2%). Se tiene como principal los defectos craneofaciales 12 (92%) y 1 (8%) defecto del tubo neural los casos. Siendo el Labio y paladar hendido con 6 (46%), casos y microtia 3 (23%) casos, en cambio en los padres de los 84 casos notificados 4 (5%) casos, siendo la Obesidad 2 (2.3%) casos con Diabetes Mellitus e hipertensión 1 caso (1.1%), los casos el defecto que presentan son craneofacial 4 (100%): 2 (50%) labio y paladar (3.7%) y microtia, holopocencefalia 1 caso (25%) respectivamente.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


Antecedentes de los padres

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
31 de enero de 2026

DISTRIBUCION DE CASOS DE DaN POR NUMERO DE CONSULTAS
DE ATENCION PRENATAL , OAXACA CUARTO TRIMESTRE 2025



- Las madres de hijos con DAN recibieron en promedio 6.6 consultas prenatales.
- El 84 % refirió recibir 1 consulta prenatal por lo menos en el primer trimestre

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


Antecedentes de los padres

Informe
SVEDAN

Fuente: Sistema
de Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos del
Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

El antecedente de los padres con casos de defectos al nacimiento por estado civil 48 (57%) de casos viven en Unión Libre, 28 (33%) casos son casados y 8 (10%) son solteras.




Antecedentes de los padres CONSUMO DE ACIDO FOLICO

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
31 de enero 2026



El 55 % de los casos tomo ácido durante el primer trimestre, El 14% de las madres lo hizo después del primer trimestre de gestación y el 11% no tomo ácido fólico. En el caso de las madres que consumieron ácido fólico durante el primer trimestre los defectos al nacimiento mas frecuentes fue el craneofacafial con 41 (89%) casos, siendo el labio y paladar hendido el que mas se presento con 18 (39%) casos. En cuanto a los defectos del tubo neural se presentaron 5 (11%) el defecto mas frecuente es Espina Bífida y anencefalia con 2 (40%) casos.


FACTORES DE RIESGO PADRES CON DEFECTOS AL NACIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2025

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Al cuarto trimestre 2025, los padres (madre y padre), la madres no presentan casos y los padres presento 1 caso con defecto al nacimiento en los 84 casos notificados.




DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FACTORES DE RIESGO DE HIJOS CON DAN CON CONSANGUINIDAD EN LOS PADRES EN EL CUARTO TRIMESTRE 2025

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026



FACTORES DE RIESGO DE HIJOS CON DAN CON CONSANGUINIDAD EN LOS PADRES EN EL CUARTO TRIMESTRE 2025

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026


- Con respecto al antecedente familiar de defectos, la rama paterna y materna notifico un caso con algún defecto al nacimiento con datos de consanguinidad., siendo defecto craneofacial (labio y paladar hendido).

DEFECTOS REPORTADOS EN RAMA FAMILIARES PATERNOS	LABIO Y PALADAR HENDIDO (1 CASO)
DEFECTOS REPORTADOS EN RAMA FAMILIARES MATERNOS	LABIO Y PALADAR HENDIDO (1 CASO)

Factores de Riesgo

HIPERTERMIA MATERNA CUARTO TRIMESTRE 2025

Los casos de DaN en el cuarto trimestre 2025, el 75 (89%) casos no tuvo hipertermia, el 4 (5%) casos presento hipertermia en el primer trimestre del embarazo y el 5 (6%) casos después del primer trimestre del embarazo en algún momento de el embarazo



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Factores de Riesgo

DIABETES GESTACIONAL CUARTO TRIMESTRE 2025


EL 16% DE LOS CASOS PRESENTO DIABETES GESTACIONAL EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO DE LA MADRE AL CUARTO TRIMESTRE 2025, 12 (92%) DEFECTOS CRANEFACIALES Y 1 (8%) DEFECTO DEL TUBO NEURAL SIEN EL LABIO Y PALADAR HENDIDO EL MASQUE MAS SE PRESENTA CON 7 (54%) .

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de octubre
de 2026

PROPORCION DE CASOS CON DIABETES GESTACIONAL CUARTO TRIMESTRE 2025



■ NO PRESENTO ■ PRIMER TRIMESTRE ■ SEGUNDO TRIMESTRE ■ TERCER TRIMESTRE

DIAGNOSTICO DE LOS HIJOS CON MADRES CON DIABETES GESTACIONAL

DEFECTOS DEL TUBO NEURAL	1 (8%)
ENCEFLOCELE	1 (8%)
MALFORMACION CRANEOFACIAL	12 (92%)
HOLOPROSENCEFALIA	1
ATRESIA DE COANAS	1
MICROTIA	3
LABIO Y PALADAR HENDIDO	7

Factores de Riesgo

INFECCIONES CUARTO TRIMESTRE 2025

CON RESPECTO A LAS INFECCIONES SE REPORTAN 5, UNA POR ENFERMEDAD TRANSMITIDA (DENGUE) POR VECTOR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y 4 POR OTRAS INFECCIONES (IVU), EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO DURANTE EL CUARTO

INFECCION	CASOS	TRIMESTRE DE EMBARAZO
DENGUE	1	SEGUNDOTRIMESTRE
CHIKV	0	
ZIKA	0	
MAYARO	0	
RUBEOLA	0	
HERPES VIRUS	0	
TOXOPLASMA	0	
VIH	0	
CITOMEGALOVIRUS	0	
INFECCION DE VIAS URINARIAS	4	ANTES DEL EMBARAZO (1), SEGUNDO TRIMESTRE (2), PRIMER TRIMESTRE (1)

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológic
a de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Factores de Riesgo

INFECCIONES PRESENTADAS EN LAS MADRES EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO Y TIPO DE DEFECTO AL NACIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
31 de enero de
2026

INFECCION	DEFECTO DEL TUBO NEURAL	DEFECTO CRANEOFACIAL
DENGUE	0	1 (LABIO Y PALADAR HENDIDO)
CHIKV	0	0
ZIKA	0	0
MAYARO	0	0
RUBEOLA	0	0
HERPES VIRUS	0	0
TOXOPLASMA	0	0
VIH	0	0
CITOMEGALOVIRUS	0	0
OTRAS INFECCIONES (INFECCION DE VIASURINARIAS)	0	4 (HIDROCEFALIA AL NACIMIENTO, MICROCEFALIS VENTRICULOMEGALIA Y HOLOPRPSENCEFALIA

Factores de Riesgo

ADICCIONES EN LOS PROGENITORES QUE PRESENTAN LOS CASOS DE DaN CUARTO TRIMESTRE 2025

PROPORCION DE ADICCIONES EN LOS PADRES



La proporción de adicciones por parte de los padres en los casos de defectos al nacimiento por parte de la madre se presente en un 7%, por parte del padre se da en un 25%

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Factores de Riesgo


ADICCIONES EN LOS PROGENITORES QUE PRESENTAN LOS CASOS DE DaN EN EL CUARTO TRIMESTRE 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
31 de enero de
2026

PROPORCION DE TIPO DE ADICCION EN LA MADRE



LAS ADICCIONES EN LAS MADRES SE PRESENTO EN 2% PARA TABACO Y ALCOHOL INHALABLES 2% INYECTABLES Y OTRAS CON 0.

PROPORCION DE TIPO DE ADICCION EN EL PADRE




26 (31%) DE LOS PADRES REFIRIO LA PRESENCIA DE ALGUNA ADICCION SIENDO EL ALCOHOL Y EL TABACO LOS MAS FRECUENTES,

Factores de Riesgo

EXPOSICIÓN A TERATOGENOS CUARTO TRIMESTRE 2025

Proporcion de madres expuestas a plaguicidas. Toxicos o medicamentos



■ NINGUNO ■ UN AÑO PREVIO AL EMBARAZO ■ DURANTE EL EMBARAZO ■ TRES MESES PREVIOS AL EMBARAZO

**EL 94 % (N: 79)
NO REPORTAN
EXPOSICION A
PLAGUICIDAS,
TOXICO U OTROS
MEDICAMENTOS,
EN LAS MADRES Y
EL 6%
REPORTARON
ALGUNA
EXPOSICIÓN A
TERATOGENOS EN
ALGUN
MOMENTO DEL
EMBARAZO**

**Informe
SVEDAN**


**Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera**

**Corte:
31 de enero de
2026**

Factores de Riesgo

EXPOSICIÓN A TERATOGENOS CUARTO TRIMESTRE 2025

Proporcion de Padres expuestas a plaguicidas. Toxicos o medicamentos



EL 88.1% (N:84) DEL PADRE NO REPORTA EXPOSICION A PLAGUCIDAS, TOXICOS U OTROS MEDICAMENTOS, Y 3 (3.6%) CASOS, UN AÑO PREVIO AL EMBARAZO Y 2(3.6%) DURANTE EL EMBARAZO.

Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Atención perinatal

Distribución de casos por momento de realización del USG cuarto trimestre 2025



El (52%) 44 casos se le realizó el USG, no realizó USG el (48%) 40 casos.

Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Atención perinatal

Distribución de casos por momento de realización del USG, cuarto trimestre 2025



De los 44 (52%) de madres; el 65% se le realizó el USG en el tercer trimestre, el 10:25% en el segundo trimestre y 4:10% en el primer trimestre. No se realizó USG el 40:48% de madres.

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN CUARTO TRIMESTRE 2025.


Distribución de casos por tipo de defecto

Las malformaciones craneofaciales son las que más se presentan con 74 (84%) casos, los defectos del tubo neural 9 (11%) y displasia del desarrollo de cadera 1 (1%)

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
31 de enero
2026



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN CUARTO TRIMESTRE 2025

Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DTN, los 9 defectos sujetos a vigilancia epidemiológica presentan 4 casos por espina bífida y una incidencia de 5.6, le sigue anencefalia con 3 casos incidencia de 4.2 y con 2 casos encefalocele con una tasa de incidencia de 2.8 casos por cada 100 mil RNV.



Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN CUARTO TRIMESTRE 2025


Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DCF, el Labio y paladar hendido reportó la mayor incidencia con 50.44 casos por cada 100 mil RNV.

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
31 de enero
de 2026



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN TERCER TRIMESTRE 2025

Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DaN por Displasia del Desarrollo de Cadera se presenta 1 caso con una tasa de incidencia de 1.4 casos por cada 100 mil RNV.



Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ATENCIÓN PERINATAL

La vía de nacimiento más frecuente fue vía cesárea con el 67% (n:56), vía vaginal 33% (n:28) cueto trimestre 2025.



N:84

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS


ATENCIÓN PERINATAL

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación Congénita de
Cadera

Corte:
31 de octubre
de 2026

Distribución de casos de DTN por vía de nacimiento Oaxaca cuarto trimestre 2025



Los defectos de tubo neural que se notificaron en el cuarto trimestre son 9 casos la vía de nacimiento fue 4(45%) vía vaginal y 5(55%) cesárea.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS


ATENCIÓN PERINATAL

Distribución de casos por defecto al nacimiento por vía de nacimiento Oaxaca cuarto trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026



Los defectos craneofaciales que se notificaron en el cuarto trimestre fueron 74 casos, el defecto por vía de nacimiento mas frecuente es cesárea 50 (68%) y vía vaginal 24 (32%) siendo el labio paladar hendido el mas frecuente con 36 casos .

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ATENCIÓN PERINATAL

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

Distribución de casos de Displasia del Desarrollo de Cadera por vía de nacimiento Oaxaca cuarto trimestre 2025

DCC	cesarea	vaginal
DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERA	1	0


Los defectos de
Displasia del Desarrollo
de Cadera 1 caso, la vía
de nacimiento fue
1(100%) cesárea.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE DaN

De los 84 (88%) de los casos se reportan vivos y 10 (12%), casos son defunciones.

Proporción de casos de DAN respecto al estado actual cuarto trimestre
Oaxaca 2025



Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE DaN CUARTO TRIMESTRE 2025

Por diagnostico las defunciones que se presentan 5 (50%) por defectos craneofaciales, Labio y Paladar Hendido 5 (100%), y 5 (50%) defectos del tubo neural, por Anencefalia 3 (30%) defunciones, Encefalocele 1 (10%) y Mielomeningocele 1(10%).




Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Por institución las defunciones, por defectos al nacimiento al tercer trimestre se presentan: IMSS-OPD 7 (70%), IMSS-BIEN 3 (30%).



■ IMSS-OPD ■ IMSS-BIEN ■ ISSSTE ■ IMSS-RO

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026


CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DTN y sexo de los casos cuarto trimestre 2025

Con respecto al sexo, los defectos del tubo neural notificados durante el tercer trimestre 2025 están a la par 5 (50%) casos en el sexo masculino y 5 (50%) casos en sexo femenino

**Informe
SVEDAN**

*Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera*


*Corte:
31 de octubre
de 2026*



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

**Distribución de casos de DAN por peso y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca
cuarto trimestre 2025***



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

Peso en gramos al nacimiento con la mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo cuarto trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación Congénita de
Cadera


Corte:
31 de enero
de 2025

peso grs		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	Masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	2090	2320
termino (37-41 sdg)	2785	3200

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

**Distribución de casos de DAN por talla y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca
cuarto trimestre 2025***



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Talla al nacimiento con la mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo cuarto trimestre 2025

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

Talla		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	41	37
termino (37-41 sdg)	49	50

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS


SOMATOMETRÍA

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Distribución de casos de DAN por perímetro cefálico y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca cuarto trimestre 2025*



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Perímetro cefálico al nacimiento con mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo cuarto trimestre 2025

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera


Corte:
31 de enero de
2026

Perímetro cefálico (cms)		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	32	34
termino (37-41 sdg)	34	51

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS TAMIZ NEONATAL

En los casos ingresados al sistema se reportó la realización de tamiz metabólico en 6 casos y auditivo en 4 casos, el resto no se realizó en el tiempo que estuvieron ingresados en un hospital.

Distribución de casos de DAN por realización de prueba de Tamiz neonatal, Oaxaca cuarto trimestre 2025*



RESULTADO	TAMIZ METABOLICO	TAMIZ AUDITIVO
NORMAL (NEGATIVO)	5	3
ALTERACION	0	1
PENDIENTE	1	1
SIN RESULTADO	5	7
SOSPECHOSO	0	0
TOTAL	11	12

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural, Craneofaciales
y Luxación Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero
de 2026

Consideraciones

Incidencia

En lo que respecta a la notificación de casos de DAN durante el cuarto trimestre 2025 en comparación con el año 2024, se observó una disminución porcentual del 13.73 % en la notificación de casos a la plataforma DaN, así mismo se continua considerando la disminución en la notificación de casos en pandemia de los años 2023, 2022 y 2021, respectivamente.

Con la implementación de la plataforma del sistema de DAN, se ha fortalecido la notificación en las unidades del sector, sin embargo, hay que continuar haciendo hincapié en las reuniones del COJUVE, CEVE y CONAVE con todas las instituciones; para dar cumplimiento a los indicadores de evaluación como son **notificación oportuna sobre todo en casos no registrados en plataforma DaN con los casos de RN en plataforma DGIS la cual continua siendo un problema en la notificación**, calidad que permita contar con una información que aporte confiabilidad para la toma de decisiones, así como la búsqueda de casos de microcefalia relacionados o no con ZIKA y otros padecimientos .

- Por JURISDICCION de residencia de la madre, según la base de datos DaN, no se han registrado casos en otros estados para el cuarto trimestre o cierre 2025.
- Para este cierre o cuarto trimestre 2025 el defecto al nacimiento que se registro en la plataforma con mayor incidencia fue los defectos craneofaciales, Labio y Paladar Hendido 36 (43%) de casos con una incidencia de 50.44 casos por cada 100 mil RNV, le sigue la Microtia con 17 casos con una incidencia de 23.82 casos por cada 100 mil RNV encontrandose las pimeros DaN malformaciones craneofaciales.
- En lo que respecta a los defectos del tubo neural solo se notificaron 9 casos siendo la espina bífida respectivamente con una incidencia de 5.6 casos por cada 100 mil RNV

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Consideraciones

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

El Labio y Paladar Hendido para el cuarto trimestre 2025 es el defecto craneofacial notificado mas frecuentemente; entre los factores de riesgo que pudieron haber influido en su desarrollo, se tiene que:

- **10 madres (28%) tenían ≤ 20 años o ≥ 35 años**
- **9 madres (11%) refirieron no haber tomado Acido Fólico durante el embarazo.**
- **1 madres (1.2%) refirieron tener alguna enfermedad crónica**
- **2 casos (2.4%) reportaron antecedente de padre o madre con defectores congénitos.**
- **También de tomar en cuenta la mortalidad (n:10) que presentan los casos de defectos al nacimiento en el estado de Oaxaca, con una letalidad de letalidad 11.9 defunciones x 100.**

Consideraciones

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de
Cadera

Corte:
31 de enero de
2026

Dentro de los subsistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles se debe solicitar el apoyo en las reuniones CONAVE para fortalecer el CUMPLIMIENTO de los lineamientos de Manual para la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento y así poder cumplir con los indicadores de programa por todas las instituciones del sector salud ya que a pesar de atenderlo en las reuniones CEVE con las instituciones no se realiza el registro de casos de listado que se les envía.

Así mismo considero que existe una subnotificación y subregistro de casos por todas las unidades medicas del sector salud publicas y privadas por falta de atención en el estado y falta de apoyo al mismo.

Falta de seguimiento de los casos desde todos los niveles de atención y coordinación con las áreas de atención medica y salud reproductiva para revisión de los censo de embarazadas en el estado consulta prenatal, aplicación de biológico, consumo de acido fólico de acuerdo a normatividad.

Realización del 100 de recién nacidos del Tamiz Neonatal

Además se debe llevar a cabo un seguimiento de los casos para su atención, revisión y nivel de vida con el resto de la población

DIRECTORIO

MC. Efrén Emmanuel Jarquín González.

Secretario General y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Dr. Eder Lopez Toro.

Director de Prevención y Control de Enfermedades

Dra. Adriana Jarquín Gonzalez.

Encargada de la Unidad de Epidemiología.

Dr. Ezequiel Diaz Cruz

Responsable Estatal de Defectos al Nacimiento