



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE DEFECTOS AL NACIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026 .

DR EZEQUIEL DIAZ CRUZ

Oaxaca de Juárez a 30 de junio de 2026



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INTRODUCCION

Informe SVEDAN

Fuente:
**Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Congénita de Cadera**

Corte:
30 de junio de 2026

La Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades no Transmisibles en los últimos años ha recobrado el interés a nivel nacional sin embargo se requiere continuar haciendo cambios y mejoras por lo que el informe trimestral describe el panorama epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento (SVEDAN) en el Estado de Oaxaca y el comportamiento de factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de casos y defunciones que se presentan y su comportamiento epidemiológico estatal y nacional. Dicha información es de gran utilidad para los tomadores de decisiones, trátase en todos los niveles de atención (unidades médicas, hospitales, jurisdicciones e instituciones del sector público y privado) en el Estado, ya que los datos proporcionados por la plataforma nos deben orientar a llevar a cabo intervenciones enfocadas principalmente en la prevención y atención de los defectos congénitos al nacimiento. Cabe mencionar que a partir del 2016 con el inicio de la vigilancia epidemiológica del defecto craneofacial (Microcefalia), y 2023 con la introducción de los defectos Osteomusculares prácticamente se retoma en el estado la vigilancia epidemiológica de estos defectos congénitos para la atención, seguimiento y prevención de casos; así mismo solicitar apoyo para evitar la subnotificación y sobregistro de casos y así dar el seguimiento y tratamiento oportuno para evitar el menor porcentaje daños a la salud de este tipo de padecimientos en la población.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INCIDENCIA

INCIDENCIA Y TASA POR JURISDICCION SANITARIA
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Informe SVEDAN

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Craneofaciales y Displasia del desarrollo de cadera
Corte: 30 de junio de 2026



Durante el segundo trimestre 2026, el estado de Oaxaca se han registrado 22 casos de DAN con una incidencia de 31.71 por 100000 nacidos vivos

Incidenia por jurisdicción sanitaria de residencia segundo trimestre 2026.



Las jurisdicciones de Valles Centrales y Tuxtepec registran la una incidencia de 66 y 24.01 por 100000 nacidos vivos


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROPORCION DE CASOS NOTIFICADOS POR INSTITUCION PRIMER TRIMESTRE 2026

Informe SVEDAN

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Craneofaciales y Displasia del desarrollo de cadera
Corte: 30 de junio de 2026




Al segundo trimestre 2026, El IMSS-OPD notifico 16(73%) casos, IMSS-BIEN 3(14%), IMSS-RO 2(9%) e ISSSTE 1(4%) casos

Antecedentes de los padres

Distribución de casos de DaN por grupo de edad y tasa segundo trimestre 2026

Informe SVEDAN

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Craneofaciales y Displasia del desarrollo de cadera
Corte: 30 de junio de 2026



El grupo de edad de 25 a 29 años notifica el mayor número de casos con 7 (31.8%) casos, le sigue el grupo de 20-24, 30-34, y 35-39 (18%) casos y el grupo de 15-19 años con 3 (13.6%) casos, la mayor tasa de incidencia se observó en el grupo de 25-29 con 7 casos por 100 mil mujeres, le sigue grupo de 20-24, 30-34 y 35-39 años con una tasa de 4 por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva y el grupo de edad 15-19 años de con tasa de 1.6 casos por cada 100 mil mujeres.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


ANTECEDENTES DE LOS PADRES

Informe SVEDAN


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Craneofaciales y Displasia del desarrollo de cadera
Corte: 30 de junio de 2026

La ocupación materna de los casos de DAN en Oaxaca el más frecuente es el hogar con 77%, mientras que en los padres es agricultura con 40%.

OCUPACION MADRE AL SEGUNDO TRIMESTRE
2026



OCUPACION PADRE SEGUNDO TRIMESTRE
2026




DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Antecedentes de los padres


Informe SVEDAN

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Craneofaciales y Displasia del desarrollo de cadera
Corte: 30 de junio de 2026

DISTRIBUCION MATERNA POR TIPO DE ENFERMEDAD CRONICA
SEGUNDOTRIMESTRE 2026



DISTRIBUCION PATERNA POR TIPO DE ENFERMEDAD CRONICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



La enfermedad crónica más frecuente es diabetes en las madres con 2 (9%) casos, Se tiene como principal los defectos craneofaciales 2 (100%) Siendo el Labio y paladar Hendido con 1 (100%).


En cambio en los padres de los 22 casos notificados la enfermedad crónica presentada es diabetes mellitus 1 (5%) casos sien el diagnostico de enfermedad craneofacial (macrocefalia) según información notificada en el segundo trimestre 2026.

Antecedentes de los padres

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera
Corte: 30 de
junio de 2026

DISTRIBUCION DE CASOS DE DaN POR NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRENATAL , OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2026




- LAS MADRES DE HIJOS CON DAN RECIBIERON EN PROMEDIO 5.8 CONSULTAS PRENATALES Y EL 9% NO RECIBIÓ NINGUNA CONSULTA PRENATAL DURANTE EL EMBARAZO.
- EL 81 % REFIRIÓ RECIBIR 1 CONSULTA PRENATAL POR LO MENOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Antecedentes de los padres

El antecedente de los padres con casos de defectos al nacimiento por estado civil 13 (59%) de casos viven en Unión Libre, 7 (32%) casos son solteros y 2 (9%) son casadas.



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026


DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Antecedentes de los padres CONSUMO DE ACIDO FOLICO

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026



El 86 % de los casos tomo ácido durante el primer trimestre, con el 9% de las madres lo hizo después del primer trimestre de gestación. En el caso de las madres que consumieron ácido fólico durante el primer trimestre los defectos al nacimiento mas frecuentes fue el craneofacafial con 18 (95%) casos, siendo el labio y paladar hendido el que mas se presento 8 (44%) casos, le siguió con 4 (8%) fueron microtia. En cuanto a los defectos del tubo neural se presento 1 (5%) el defecto es encefalocele


FACTORES DE RIESGO PADRES CON DEFECTOS AL NACIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Al segundo trimestre 2026, los padres (madre y padre), la madres presentan 1 (5%) casos, siendo el caso 1 (100%) defecto craneofacial (Microcefalia) y los padres no presentaron defectos al nacimiento en los 22 casos notificados.



DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FACTORES DE RIESGO DE HIJOS CON DAN CON CONSANGUINIDAD EN LOS PADRES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026


Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
Desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

El 4.5% en los padres (MADRE) presento algún antecedente de consanguinidad.

- Con respecto al antecedente familiar de defectos, la rama materna presenta el antecedente de 1 (4.5%) casos con defecto al nacimiento, tratándose de defecto craneofacial (microcefalia), y 1 familiar materno 1 (4.5%) familiar con algún defecto al nacimiento con datos de consanguinidad rama materna. La rama paterna no presento algún defecto al nacimiento



FACTORES DE RIESGO DE HIJOS CON DAN CON CONSANGUINIDAD EN LOS PADRES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

- Con respecto al antecedentes de hijos con y familiares de defectos, la rama paterna y materna notifico un caso, siendo 1 defecto craneofacial (microcefalia) y 1 defecto osteomuscular(displasia en el desarrollo de cadera

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia
del desarrollo
de Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

DEFECTOS NOTIFICADOS EN HIJOS CON DaN
PREVIOS

DEFECTO CRANEOFACIAL
(MICROCEFALIA)


DEFECTOS REPORTADOS EN RAMA
FAMILIARES MATERNOS

DEFECTOS EN EL
DESARRO DE CADERA
(1)

Factores de Riesgo

HIPERTERMIA MATERNA CUARTO TRIMESTRE 2025

Los casos de DaN al segundo trimestre 2026, el 21 (95.5%) casos no presento hipertermia, 1 (4.5%) caso presento hipertermia después del primer trimestre del embarazo.



**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera


Corte:
30 de junio de
2026

Factores de Riesgo

DIABETES GESTACIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

EL 14% DE LOS CASOS PRESENTO DIABETES GESTACIONAL EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO. 2 (9%) CASO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y 1 (5%) EN EL TERCER TRIMESTRE. LOS DEFECTOS PRESENTADOS FUERON: 2 (100%) DEFECTOS CRANEFACIALES SIENDO EL LABIO Y PALADAR HENDIDO EL QUE SE PRESENTA CON 2 (100%) .

PROPORCION DE CASOS CON DIABETES GESTACIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DIAGNOSTICO DE LOS HIJOS CON MADRES CON DIABETES GESTACIONAL

DEFECTO AL NACIMIENTO	CASOS
DEFECTO CRANEOFACIAL 3 (16%)	LABIO Y PALADAR HENDIDO (2) Y 1 MACROCEALIA

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
Displasia del
desarrollo de
cadera

Corte:
30 de junio de
2026

■ NO PRESENTO ■ PRIMER TRIMESTRE ■ SEGUNDO TRIMESTRE ■ TERCER TRIMESTRE

Factores de Riesgo

INFECCIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2026

CON RESPECTO A LAS INFECCIONES SE NO SE REPORTAN INFECCIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio
de 2026

INFECCION	CASOS	TRIMESTRE DE EMBARAZO
DENGUE	0	0
CHIKV	0	0
ZIKA	0	0
MAYARO	0	0
RUBEOLA	0	0
HERPESVIRUS	0	0
TOXOPLASMA	0	0
VIH	0	0
CITOMEGALOVIRUS	0	0
OTRAS	0	0

Factores de Riesgo

INFECCIONES PRESENTADAS EN LAS MADRES EN ALGUN TRIMESTRE DEL EMBARAZO Y TIPO DE DEFECTO AL NACIMIENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera


Corte:
30 de junio de
2026

INFECCION	DTN	CRANEOFACIAL
DENGUE	0	0
CHIKV	0	0
ZIKA	0	0
MAYARO	0	0
RUBEOLA	0	0
HERPESVIRUS	0	0
TOXOPLASMA	0	0
VIH	0	0
CITOMEGALOVIRUS	0	0
OTRAS	0	0

Factores de Riesgo

ADICCIONES EN LOS PROGENITORES QUE PRESENTAN LOS CASOS DE DaN SEGUNDO TRIMESTRE 2026

PROPORCION DE ADICCIONES EN LOS PADRES



La proporción de adicciones por parte de los padres en los casos de defectos al nacimiento por parte de la madre se presente en un 14%, por parte del padre se da en un 59%

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Factores de Riesgo


ADICCIONES EN LOS PROGENITORES QUE PRESENTAN LOS CASOS DE DaN AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, Displasia del desarrollo de Cadera


Corte:
30 de junio de
2026

PROPORCION DE TIPO DE ADICCION EN LA MADRE



LAS ADICCIONES EN LAS MADRES SE PRESENTO EN 2 (9%) CASO PARA ALCOHOL Y 7 (32%) CASO EN BLANCO.

PROPORCION DE TIPO DE ADICCION EN EL PADRE




64% (n:14) DE LOS PADRES REFIRIO EL CONSUMO CIA DE ALGUNA ADICCION SIENDO EL ALCOHOL Y EL TABACO LOS MAS FRECUENTES,

Factores de Riesgo

EXPOSICIÓN A TERATOGENOS SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Proporcion de madres expuestas a plaguicidas. Toxicos o medicamentos



21(95%) NO REPORTAN EXPOSICION A PLAGUICIDAS, TOXICO U OTROS MEDICAMENTOS, EN LAS MADRES

■ NINGUNO ■ UN AÑO PREVIO AL EMBARAZO ■ DURANTE EL EMBARAZO ■ TRES MESES PREVIOS AL EMBARAZO

**Informe
SVEDAN**


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Factores de Riesgo

EXPOSICIÓN A TERATOGENOS SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Proporcion de Padres expuestas a plaguicidas. Toxicos o medicamentos



- NINGUNO
- DURANTE EL EMBARAZO
- VACIO
- TRES MESES PREVIOS AL EMBARAZO
- UN AÑO PREVIO AL EMBARAZO

EN 19(86%) DE LOS PADRES NO REPORTA EXPOSICION A PLAGUCIDAS, TOXICOS U OTROS MEDICAMENTOS, Y 3 (14%) CASOS, SE EXPUSIERON DURANTE EL EMBARAZO

**Informe
SVEDAN**


**Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Luxación
Co Displasia
del desarrollo
de Cadera**

**Corte:
30 de junio de
2026**

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Atención perinatal

Proporción de casos por momento de realización del USG al segundo trimestre 2026



De los 22 casos
12(55%) no se
le realizó el USG,
se realizó USG el
10 (45%) casos
se realizó en
algún momento
del embarazo, .

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia
del desarrollo
de cadera

Corte:
30 de junio de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS


Atención perinatal

Proporción de casos que se realizó el USG, segundo trimestre 2026

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026



■ PRIMER TRIMESTRE ■ SEGUNDO TRIMESTRE ■ TERCER TRIMESTRE

De las 10(45%) de madres que se realizaron; el 5 (50%) se le realizó el USG en el tercer trimestre, el 4:40% en el segundo trimestre 1 (5%) en el primer trimestre de embarazo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DaN SEGUNDO TRIMESTRE 2026.


Distribución de casos por tipo de defecto

Las malformaciones craneofaciales son las que más se presentan con 21 (95%) casos, los defectos del tubo neural 1 (5%) y displasia del desarrollo de cadera 0 (0%)

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y displasia del
desarrollo de
Cadera


Corte:
30 de junio
2026



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN PRIMER TRIMESTRE 2026

Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DTN, el defecto sujetos a vigilancia epidemiológica presentan 1 caso por encefalocele con una incidencia de 1.4 casos por cada 100 mil RNV.



Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera
Corte:
30 de junio de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DAN PRIMER SEGUNDO 2026


Distribución de casos por tipo de defecto

Dentro de los DCF, el Labio y paladar hendido reportó la mayor incidencia con 9.81 (n:7) casos por cada 100 mil RNV.

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026




CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ATENCIÓN PERINATAL

La vía de nacimiento más frecuente fue vía cesárea con el 12 (55%), vía vaginal 10 (45%) al segundo trimestre 2026.

N:22




**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS ATENCIÓN PERINATAL

Distribución de casos de DTN por vía de nacimiento Oaxaca segundo trimestre 2026



Los defectos de tubo neural que se notificaron en el primer trimestre son 1 caso la vía de nacimiento fue 1(100%) cesárea.

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026


CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ATENCIÓN PERINATAL

Distribución de casos por defecto al nacimiento por vía de nacimiento Oaxaca segundo trimestre 2026

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera
Corte:
31 de marzo
de 2026




Los defectos craneofaciales que se notificaron en el segundo trimestre fueron 21 casos, los defectos por vía de nacimiento se encuentran en 11(52%) mas frecuente es cesárea y vía vaginal 10 (48%), siendo el labio paladar hendido el mas frecuente con 4 casos .

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE DaN

De los 22 casos de defectos al nacimiento 20 (91%) de los casos se reportan vivos y 2 (9%), casos son defunciones, las 2 (100%) son defectos craneofaciales por ventriculomegalia.

Proporción de casos de DAN respecto al estado actual segundo trimestre Oaxaca 2026



Informe
SVEDAN


Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales y
Displasia del
desarrollo de
cadera

Corte:
30 de junio 2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

Distribución de casos de DAN por peso y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca segundo trimestre 2026*



Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

Peso en gramos al nacimiento con la mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo segundo trimestre 2026

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera


Corte:
30 de junio de
2025

peso grs		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	Masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	1820	2325
termino (37-41 sdg)	2335	3020

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

Somatometría

Distribución de casos de DAN por talla y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca segundo trimestre 2026*



Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia
del desarrollo
de Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Talla al nacimiento con la mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo segundo trimestre 2025

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia
del desarrollo
de Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Talla		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	35	43
termino (37-41 sdg)	50	49

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS


SOMATOMETRÍA

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Distribución de casos de DAN por perímetro cefálico y semana de gestación al Nacimiento, Oaxaca segundo trimestre 2026*



CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

SOMATOMETRÍA

Perímetro cefálico al nacimiento con mediana de acuerdo a edad gestacional y sexo segundo trimestre 2026

**Informe
SVEDAN**

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de Defectos
del Tubo Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera


Corte:
30 de junio de
2026

Perímetro cefálico (cms)		
edad gestacional	Femenino (MEDIANA)	masculino (MEDIANA)
pretermino (27-36 sdg)	28	31
termino (37-41 sdg)	32.2	33

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS TAMIZ NEONATAL

En los casos ingresados al sistema se reportó la realización de tamiz metabólico en 6 casos y auditivo en 4 casos, el resto no se realizó en el tiempo que estuvieron ingresados en un hospital.

Distribución de casos de DAN por realización de prueba de Tamiz neonatal, Oaxaca segundo trimestre 2026*



RESULTADO	TAMIZ METABOLICO	TAMIZ AUDITIVO
NORMAL (NEGATIVO)	0	0
ALTERACION	0	0
PENDIENTE	0	0
SIN RESULTADO	3	1
SOSPECHOSO	0	0
TOTAL	3	1

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Consideraciones

Incidencia

En lo que respecta a la notificación de casos de DAN durante al segundo trimestre 2026 en comparación con el año 2025, se observó una disminución porcentual del 12 % en la notificación de casos a la plataforma DaN, así mismo se continua considerando la disminución en la notificación de casos en pandemia de los años 2023, 2022 y 2021, respectivamente.

Con la implementación de la plataforma del sistema de DAN, se ha fortalecido la notificación en las unidades del sector, sin embargo, hay que continuar haciendo hincapié en las reuniones del COJUVE, CEVE y CONAVE con todas las instituciones; para dar cumplimiento a los indicadores de evaluación como son **notificación oportuna sobre todo en casos no registrados en plataforma DaN con los casos de RN en plataforma DGIS la cual continua siendo un problema en la notificación en el estado de Oaxaca**, calidad en la información que permita contar con una información que aporte confiabilidad para la toma de decisiones, así como la búsqueda de casos de microcefalia relacionados o no con ZIKA y otros padecimientos con su seguimiento.

- Por JURISDICCION de residencia de la madre, según la base de datos DaN, no se han registrado casos en otros estados para el segundo trimestre 2026.
- Para este segundo trimestre 2026 el defecto al nacimiento que se registro en la plataforma con mayor incidencia fue los defectos craneofaciales, Labio y Paladar Hendido 7 (32%) de casos con una incidencia de 9.81 casos por cada 100 mil RNV, le sigue la microtia con 4 (18%) y tasa de 7 casos por 1000000 recién nacidos los demás defectos al nacimiento con un caso por defectos del tubo neural o craneofacial con una incidencia de 1.4 casos por cada 100 mil RNV encontrándose las primeras DaN malformaciones craneofaciales.
- En lo que respecta a los defectos del tubo neural solo se notificaron 1 caso siendo el encefalocele con una incidencia de 1.4 casos por cada 100 mil RNV

Informe
SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Consideraciones

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

El Labio y Paladar Hendido para el segundo trimestre 2026 es el defecto craneofacial notificado mas frecuentemente; entre los factores de riesgo que pudieron haber influido en su desarrollo, se tiene que:

- **Las madres (12.5%) tenían entre 20-35 años con un promedio de 30 años.**
- **7 (100%) refirieron no haber tomado Acido Fólico durante el embarazo.**
- **1 madres (5%) refirieron tener alguna enfermedad crónica**
- **2 casos (9%) reportaron antecedente de padre o madre con defectors congénitos.**

El tamiz neonatal no se realiza solo el 13.6% y sin resultados en la el estudio epidemiologico

•Para el segundo trimestre 2026 se han presentado 2 (9%) la tasa de letalidad en recién nacidos con defectos al nacimiento

Consideraciones

Informe SVEDAN

Fuente:
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
de Defectos
del Tubo
Neural,
Craneofaciales
y Displasia del
desarrollo de
Cadera

Corte:
30 de junio de
2026

Dentro de los subsistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles se debe solicitar el apoyo en las reuniones CONAVE para fortalecer el CUMPLIMIENTO de los lineamientos de Manual para la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento y así poder cumplir con los indicadores de programa por todas las instituciones del sector salud ya que a pesar de atenderlo en las reuniones CEVE con las instituciones no se realiza el registro de casos de listado que se les envía.

Así mismo considero que existe una subnotificación y subregistro de casos por todas las unidades medicas del sector salud publicas y privadas por falta de atención en el estado y país sin apoyo para el mismo.

Falta de seguimiento de los casos desde todos los niveles de atención y coordinación con las áreas de atención medica y salud reproductiva para revisión de los censo de embarazadas en el estado, consulta prenatal, aplicación de biológico, consumo de acido fólico de acuerdo a normatividad.

Realización del 100 % de recién nacidos del Tamiz Neonatal

Además se debe llevar a cabo un seguimiento de los casos para su atención, revisión y mejorar el nivel de vida de estos casos

DIRECTORIO

MC. Efrén Emmanuel Jarquín González.

Secretario General y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Dr. Eder Lopez Toro.

Director de Prevención y Control de Enfermedades

Dra. Elizabeth Peto Toledo.

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Ezequiel Diaz Cruz

Responsable Estatal de Defectos al Nacimiento