

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LAS DEFUNCIONES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Período julio-septiembre del año 2022

DIRECTORIO

Mtra. Virginia Sánchez Ríos

Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de Oaxaca

M.C. Sonia Eréndira Ramírez Luna

Subdirectora General de los Servicios de Salud de Oaxaca

M.C. Vladimir Eliel Hernández Sosa

Director de Prevención y Promoción de la Salud

M.C. Argelia Julián Aquino

Jefa de la Unidad de Epidemiología

M.C. Sofía Asunción Castellanos Sánchez

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Introducción.-

En la práctica médica, la muerte de un paciente es una de las situaciones más difíciles a las que se enfrenta el personal de salud.

Es un hecho que forma parte de las estadísticas vitales junto con los registros de nacimientos, muertes fetales, matrimonios y divorcios.

La mortalidad es un indicador muy importante para la toma de decisiones, cuando se realiza un análisis detallado de las características del suceso, como son temporalidad, lugar de ocurrencia, grupo de edad, sexo, municipio de residencia del (a) persona finada.

Desde el año 2020, debido a pandemia por COVID-19, cuando se registró la primera defunción por esta causa, el número de decesos por esta enfermedad incrementó la cifra de defunciones en México del promedio anual.

Las defunciones por enfermedades crónico-degenerativas siguen en aumento y ahora se suma el SARS-COV-2 como comorbilidad; a pesar de la disminución de las defunciones, es una enfermedad que continuará de forma endémica entre la población mexicana, se espera que la vacunación disminuya la tasa de mortalidad.

septiembre del 2022: gastroenteritis infecciosa, neumonía, VIH y tuberculosis. Se puede verificar que la gastroenteritis se presenta nuevamente en menores de 5 años, la neumonía ha sido la causa de muerte en los extremos de la vida principalmente, el virus de inmunodeficiencia humana causó la muerte principalmente a partir de los 20 años de edad, aunque hubo una defunción en el grupo de edad de 5 a 9 años y la tuberculosis causó defunciones a partir de los 25 años de edad.




Gráfico N°2

El virus SARS-COV-2 en el estado de Oaxaca, del período julio-septiembre del año 2022, ha causado la muerte en todos los grupos de edad, predominando en el de 65 años y más, con 60 defunciones, seguido del de 55 a 59 años con 7 defunciones; el grupo de edad menos afectado fue el de 5 a 9 años con 0 defunciones (Gráfico N°2).




Gráfico N°1

En el gráfico número 1, se observan las principales causas de defunción por frecuencia simple, (exceptuando al SARS-COV-2), del período julio a

Causa de defunción	Grupos de edad por sexo																		TOTAL
	<1 año	1-4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 y +				
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Gastroenteritis infecciosa	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
V.I.H.	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	9	
Neumonía	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	18	
SARS-COV-2	2	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	3	0	3	2	1	1	22	
Total	8	3	3	5	0	1	1	2	0	3	0	2	3	2	1	3	48		

Gráfico N°3

En el gráfico número 3, se identifican en frecuencia simple y según sexo, las muertes por tuberculosis,

gastroenteritis infecciosa, neumonía, V.I.H. y SARS-COV-2.

Del total de 162 defunciones validadas por el nivel Estatal (Departamento de vigilancia epidemiológica), 102 corresponden a hombres y 60 a mujeres, según se observa en el gráfico número 4.




Gráfico N°4




Gráfico N°5

En la imagen del gráfico N°5 se muestra la frecuencia simple del número de defunciones de causa sujeta a vigilancia epidemiológica, validadas a la fecha por el nivel estatal; observamos que la Jurisdicción Sanitaria número 1, de Valles Centrales, es la que tiene la cifra más alta y la

Jurisdicción 6, la Sierra, tuvo el menor número de muertes, esto tomando en consideración la afluencia de personas y la accesibilidad a los servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención que predominan en la Jurisdicción 1.




Gráfico N°6

Del total de muertes en el período mencionado anteriormente, los 3 sitios de mayor ocurrencia de defunciones fueron: el hogar, la Secretaría de Salud y el IMSS ordinario, con estos datos podemos inferir que muchas de las personas que cursaron con una patología de vigilancia epidemiológica no solicitaron atención médica oportuna o carecieron del acceso a esta, por lo que fallecieron en su domicilio. (Gráfico N°6)




Gráfico N°7

Los 3 municipios del estado que presentaron más defunciones de causa sujeta a vigilancia epidemiológica en orden de frecuencia son: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y San Bartolo Coyotepec. (Gráfico N° 7).

La principal causa de muerte de vigilancia epidemiológica, en la ciudad de Oaxaca es el SARS-COV-2, esto debido a la pandemia que cursamos desde el año 2019.



Gráfico N°8

De total de defunciones de vigilancia epidemiológica, ocurridas en el período julio-septiembre del 2022, se observa en el gráfico N° 8 que 78 personas fallecidas no contaban con derechohabencia, 40 tenían derecho a las prestaciones del IMSS ordinario y 16 al ISSSTE.

De la suma de “no especificado” y “se ignora” tenemos un total de 19 defunciones de las cuales no se conoce si tuvieron alguna derechohabencia, lo que indica que el llenado del certificado de defunción, (fuente primaria del SEED), fue inespecífico en este rubro.

CONCLUSIONES

En comparación al boletín epidemiológico del SEED del primer trimestre, hubo una reducción en las cifras de mortalidad, pero se continúa teniendo decesos por enfermedades infecto-contagiosas. Predominan las muertes por enfermedades

respiratorias, esto debido a la pandemia que azota a nuestro estado desde el año 2020.

Las defunciones por gastroenteritis infecciosa pueden disminuir, capacitando a los progenitores respecto a los signos y síntomas de alarma así como a los médicos de unidades públicas y particulares respecto al diagnóstico y tratamiento; la accesibilidad a los servicios de salud es un tema a considerar también es este rubro, porque existen comunidades alejadas, de forma de vida muy precaria, que también necesitan servicios de salud y aún no cuentan con ello.

La presencia de defunciones por V.I.H. se siguen presentando en la adolescencia, teniendo en consideración que el uso correcto del preservativo puede prevenir la infección, por lo tanto podemos reforzar la capacitación referente a este tema, ya que ha cobrado vidas y estos pacientes pueden haber contagiado a otras personas previamente a conocer su diagnóstico.

La tuberculosis se ha presentado desde hace cientos de años y ahora se observa en algunos casos, que a pesar de existir tratamiento, se ha caído en fármaco resistencia, peligrosa para la población actual.